



จิ้งจอกโรงจอกแดง



Tetragonula pagdeni (Schwarz, 1939)



ที่มาภาพ : http://v3.boldsystems.org/index.php/Taxbrowser_Taxonpage?taxid=590133#

- ❖ มีขนาดตัวเล็ก ลำตัวจิ้งจอกนางอายประมาณ 3.65 มม. ใช้อุ้งมือสีน้ำตาลเข้ม ปีกบางใส
- ❖ ลักษณะปากทวารทั้งรังมีรูหลายรูแบบทั้งสั้นและยาว ส่วนใหญ่จะมีสีเข้มเป็นยางอ่อนไม่แข็งเหมือนนางอายพันธุ์
- ❖ ลักษณะพิเศษคือจะมีรังจากหรือรังทหารยื่นสังเกตการณ์อยู่บริเวณหน้ารังเสมอ
- ❖ เมื่อถูกรบกวนจะโจมตีด้วยการรุมกัดโดยเฉพาะบริเวณที่มีสีเข้ม เช่น เส้นขน เส้นขี้ เป็นต้น หรือในบางกรณีจะถอยร่นเข้าไปอยู่ในรัง
- ❖ ระยะการปีนหาคิณ 300 เมตร รอบรัศมีจิ้งจอก
- ❖ การสร้างเซลล์ตัวอ่อน เรียงตัวแบบกลุ่ม (cluster development)
- ❖ น้ำผึ้งมีรสหวานอมเปรี้ยว
- ❖ สามารถจัดการเพื่อเลี้ยงจิ้งจอกได้ประกอบและแยกขยายภายในฟาร์มที่เลี้ยงได้

