




# จันทน์โรจนุจิอุรุม



## *Tetragonula laeviceps* (Smith, 1857)



ที่มาภาพ : ปวีวรรณ

ที่มาภาพ : ปวีวรรณ

- ❖ เป็นจันทน์โรจนุจิอุรุมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขนาดเล็ก ความยาวตัวรวมปีก 2.5 - 4.5 มม. หัวกว้างเท่าอก มีขนาดหัว 3.99 - 4.10 มม. หัวมีสีน้ำตาลสว่าง ปีกบางใส
- ❖ มีความกว้างของส่วนหัว 1.39 - 1.46 มม. (Sakagami, 1978)
- ❖ ลักษณะปากทางเข้ารังมีหลายรูปแบบทั้งสั้นและยาว ส่วนใหญ่จะมีสีเข้มเป็นยางอ่อนไม่แข็งเหมือนบางสายพันธุ์
- ❖ พฤติกรรมเมื่อถูกรบกวนจะโจมตีด้วยการรุมกัดโดยเฉพาะบริเวณที่มีสีเข้ม เช่น เส้นผม เส้นขี้ เป็นต้น หรือในบางครั้งจะถอยร่นเข้าไปอยู่ในรัง
- ❖ ระยะการบินหากิน 300 เมตร รอบรัศมีของรัง
- ❖ การสร้างเซลล์หัวอ่อน เรียงตัวแบบแผนจรรรมตา หรือแผนจวี (comb development)
- ❖ น้ำผึ้งมีรสหวานอมเปรี้ยว
- ❖ สามารถจัดการเพื่อเลี้ยงจันทน์ได้ประกอบและแยกขยายภายในฟาร์มที่เลี้ยงได้

